

# Comprendre Prolia™

Votre médecin vous a prescrit Prolia. Voici les réponses aux questions courantes que vous pourriez avoir concernant votre traitement.



### Qu'est-ce que Prolia?

Prolia (denosumab injection) est utilisé pour traiter l'ostéoporose chez les femmes ménopausées qui ont un risque accru de fractures, qui ne peuvent pas utiliser d'autres médicaments contre l'ostéoporose, ou chez qui les autres médicaments contre l'ostéoporose n'ont pas bien fonctionné. Prolia est également utilisé pour augmenter la masse osseuse chez les hommes atteints d'ostéoporose qui sont à risque élevé de fractures.

#### Comment agit-il?

Le tissu osseux est en constante évolution. Normalement, il y a un équilibre entre les cellules qui éliminent l'ancien tissu osseux et celles qui forment le nouveau. En présence d'ostéoporose, le tissu osseux est détruit plus rapidement que l'organisme est capable d'en former du nouveau, si bien qu'il y a perte osseuse. Vos os deviennent plus minces, plus fragiles et plus susceptibles de se casser.

Prolia agit en bloquant le ligand du RANK, une protéine qui stimule les cellules qui décomposent les os. Cet effet renforce vos os en augmentant la masse osseuse et en diminuant les risques de fractures de la hanche, de la colonne vertébrale et d'autres os.

## Quand et comment devrais-je prendre Prolia?

Il est important de recevoir votre injection de Prolia tous les 6 mois. Vous devez prendre des suppléments de calcium et de vitamine D selon les recommandations de votre professionnel de la santé. Manger de façon équilibrée vous aidera à maîtriser votre apport en calcium.



Prolia s'administre par une seule injection sous la peau dans le haut du bras, le haut de la cuisse ou l'abdomen. Prolia peut être administré par un professionnel de santé ou une personne formée pour donner des injections, ou un patient peut s'administrer lui-même l'injection si un professionnel de la santé estime que cette mesure est appropriée.

#### N'oubliez pas -

Placez un rappel sur votre calendrier pour recevoir votre injection tous les 6 mois.



Si vous oubliez une dose, vous devez recevoir la dose suivante aussitôt qu'il vous sera pratique de le faire. Prévoyez votre prochaine dose 6 mois après la date de votre dernière injection.

N'oubliez pas -Prolia peut être administré en tout temps, avec ou sans aliments.







#### Vous avez des questions?

Veuillez consulter le feuillet Renseignements sur le médicament pour le patient reçu avec votre médicament.

# Commencez et poursuivez avec le programme de soutien provital

## Comment vais-je me souvenir de prendre Prolia, et ainsi poursuivre mon traitement?

Le programme de soutien aux patients ProVital<sup>MD</sup> (offert par les services de soutien aux patients AMGEN Entrust<sup>MC</sup>)\* vous aidera à commencer et à poursuivre votre traitement par Prolia. En tant que membre du programme, vous recevrez régulièrement des communications qui vous aideront à en savoir plus sur l'ostéoporose et à gérer vos rendez-vous pour recevoir vos injections de Prolia.

Apercu des services offerts :

- Rappels pour les prochaines injections
- Bulletins visant à vous renseigner et à vous aider à toutes les étapes du programme
- Accès téléphonique au programme de soutien ProVital et soutien pour répondre à vos questions concernant Prolia

Vous pouvez aussi demander à votre professionnel de la santé de vous remettre la carte de rappel avec autocollants pour calendrier qui se trouve dans la boîte de Prolia pour vous aider à ne pas oublier votre prochain rendez-vous.

#### Comment puis-je m'inscrire au programme de soutien ProVital?

• Appelez sans frais au : 1-877-776-1002 de 8 h à 20 h, HNE, du lundi au vendredi.

# Où puis-je trouver plus d'information? Prolia.ca


Prolia.ca est une ressource en ligne offrant davantage d'information sur Prolia et sur l'ostéoporose postménopausique. Vous y trouverez des réponses aux questions fréquentes et y apprendrez ce que vous pouvez escompter de votre traitement.

Visitez Prolia.ca ou appelez au 1-877-776-1002 pour vous inscrire dès aujourd'hui!

Vous aurez besoin du numéro d'identification du médicament (DIN) de Prolia pour accéder au site Web. Le DIN de Prolia est le 02343541.



Mise en garde et précautions : Prolia contient le même médicament qu'un autre produit appelé XGEVA; si vous recevez un traitement par Prolia, vous ne devriez pas prendre XGEVA, et vice versa. Il y a un risque accru d'infection cutanée (cellulite); consultez d'urgence votre médecin si vous avez la peau enflée, rouge, chaude ou douloureuse, avec ou sans fièvre. Prolia peut abaisser le taux de calcium dans le sang; avisez votre médecin si vous avez des spasmes musculaires, des soubresauts, des crampes, un engourdissement ou des picotements dans les mains, les pieds ou autour de la bouche, et une faiblesse. Vous devez prendre des suppléments de calcium et de vitamine D selon les recommandations de votre professionnel de la santé. Le capuchon de l'aiguille de la seringue préremplie à usage unique contient du caoutchouc naturel sec (latex), qui ne doit pas être manipulé par les personnes qui y sont allergiques. Ne prenez pas Prolia si vous êtes enceinte ou pouvez le devenir car Prolia pourrait faire du tort à un enfant à naître. Votre professionnel de la santé devrait vous faire passer un test de grossesse avant le début de votre traitement par Prolia. Utilisez une méthode de contraception efficace tout au long du traitement par Prolia et pendant au moins 5 mois après avoir pris votre dernière dose de Prolia. Cessez de prendre Prolia et avisez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte pendant le traitement par Prolia. Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre Prolia. Informez votre médecin si vous présentez : des symptômes d'infection (fièvre, frissons, douleurs abdominales intenses, envies d'uriner fréquentes ou impérieuses ou sensation de brûlure en urinant); une infection à l'oreille; des problèmes de peau (rougeurs, démangeaisons, éruptions cutanées, peau sèche ou parcheminée, lésion ouverte, croûtes ou desquamation, cloques); tout symptôme dentaire, entre autres une douleur ou une sensation inhabituelle dans les dents ou les gencives, ou une infection dentaire (ostéonécrose de la mâchoire); une douleur nouvelle ou inhabituelle à la hanche, à l'aine ou à la cuisse, car des fractures inhabituelles de l'os de la cuisse se sont produites; une réaction allergique (sensation de faiblesse, difficulté à respirer/respiration



Avant d'utiliser Prolia: consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous: avez un faible taux de calcium sanguin; ne pouvez pas prendre du calcium et de la vitamine D tous les jours; avez subi une intervention chirurgicale des parathyroïdes ou de la thyroïde (glandes situées dans le cou); avez appris que vous avez de la difficulté à absorber les minéraux dans l'estomac ou l'intestin (syndrome de malabsorption); êtes atteint d'une maladie des reins ou devez être traités par dialyse; avez déjà eu une réaction allergique à Prolia; prévoyez subir une chirurgie ou une extraction dentaire; avez des antécédents de cancer; êtes enceinte ou pourriez devenir enceinte; avez une allergie au caoutchouc ou au latex

Pour obtenir une liste complète des effets secondaires et des informations relatives à la sécurité, veuillez consulter le feuillet **Renseignement sur le médicament pour le patient** reçu avec votre médicament. Si vous êtes inquiets à cause d'effets que vous ressentez avec votre traitement par Prolia, veuillez consulter votre médecin ou pharmacien.

\* AMGEN Entrust est notre nouvelle plateforme unifiée de services de soutien aux patients, qui s'appuie sur l'acquis de nos programmes de soutien propres à chaque marque.

© 2021 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés. Prolia<sup>MO</sup>, ProVital<sup>MO</sup> et XGEVA<sup>MO</sup> sont des marques déposées d'Amgen Inc., utilisées avec autorisation. AMGEN ENTRUST  $^{\mathrm{MC}}$  est une marque de commerce d'Amgen Inc.













Pour obtenir un nouveau bloc d'information destinée aux patients traités par Prolia, communiquez avec votre représentant Amgen.